

RECOMENDACIONES AL PACIENTE SOMETIDO A BIOPSIA TRANSRECTAL DE PRÓSTATA

Una vez que se decide la necesidad de obtener biopsias de próstata, se le prescribirá un antibiótico que deberá tomar cada 12 horas. Debe comenzar a tomarlo la noche anterior al día de la biopsia y continuar mañana y noche durante un total de 5 días.

Para la biopsia conviene tener el recto vacío y por lo tanto sería oportuno el administrarse un pequeño enema (Micalax®) de 1 a 2 horas antes.

Es muy probable que la orina, las heces y el semen puedan teñirse de sangre en los días posteriores a la biopsia, no debe preocuparse, es lo normal.

Tras la biopsia evite esfuerzos o calor excesivos para no favorecer el sangrado y recuerde beber mucha agua las 48 horas siguientes.

Si persiste el dolor tras la prueba, tome su calmante habitual pero evite la Aspirina® o Adiro® (Acido acetil salicílico).

Algo de febrícula (décimas de fiebre) tras la biopsia es normal. En caso de fiebre alta (> 38°) o sangrado importante (bien por recto o uretra) deberá acudir al Servicio de Urgencias de Hospital Quirón Málaga.

Si presenta algún problema desde que se le entrega esta documentación hasta el día de la biopsia que pudiese impedir la realización de la misma debe informarnos lo antes posible, llamando al teléfono del Hospital Quirón Málaga, 902 448855. Posteriormente deberá pedir otra vez cita en consulta para evaluar de nuevo su caso y volver a programar el día de quirófano.